支持单位

阿拉善基金会
北京山水伙伴文化发展有限责任公司
汇丰(中国)有限公司
欧莱雅(中国)有限公司
四川省绵阳市平武县林草局
四川省犍为凤生纸业有限责任公司

图片来源：红外相机及调查照片
资料来源：中国野鸟图库、中国动物主题数据库、中国鸟类分类与分布名录(第三版)、IUCN Red List of Threatened Species
制作：山水自然保护中心

本手册只作非商业盈利使用

山水自然保护中心
平武县关坝流域自然保护小区

关坝物种名录手册
SPECIES LIST OF GUANBA VILLAGE



平武县关坝流域自然保护小区位置示意图

前言

平武县关坝流域自然保护小区成立于2016年1月20日，面积40.3平方公里。东邻唐家河保护区，东南邻老河沟保护区，南邻余家山保护区，西邻小河沟保护区，位于大熊猫岷山A种群栖息地，属于重要的生态走廊带。成立保护小区目的在于为大熊猫保护以及社区参与保护探索发展与保护的新平衡，示范以生态文明建设为核心的"精准扶贫"模式，同时也为大熊猫栖息地集体公益林管理提供新的思路。

此图册将近几年关坝红外相机拍摄到的和调查过程中所拍摄到的动物图片整理成册，并按照动物名录顺序制作，动物描述来源于中国动物主题数据库和中国野鸟图库。只做展示，如有遗漏，敬请指正。



关坝物种名录手册

Species List of Guanba Village

目录 CONTENTS

■ 兽类 MAMMALS 01

▸ 灵长目 PRIMATES 03
猴科 Cercopithecidae 03
川金丝猴 *Rhinopithecus roxellana* 03

▸ 食肉目 CARNIVORA 05
熊科 Ursidae 05
黑熊 *Ursus thibetanus* 05
大熊猫 *Ailuropoda melanoleuca* 07
鼬科 Mustelidae 09
黄喉貂 *Martes flavigula* 09
黄鼬 *Mustela sibirica* 11
灵猫科 Viverridae 13
花面狸 *Paguma larvata* 13
猫科 Felidae 15
豹猫 *Prionailurus bengalensis* 15

▸ 偶蹄目 ARTIODACTYLA 17
猪科 Suidae 17
野猪 *Sus scrofa* 17
鹿科 Cervidae 19
毛冠鹿 *Elaphodus cephalophus* 19
牛科 Bovidae 21
羚牛 *Budorcas taxicolor* 21
斑羚 *Naemorhedus goral* 23
鬣羚 *Capricornis sumatraensis* 25

▸ 啮齿目 RODENTIA 27
松鼠科 Sciuridae 27
岩松鼠 *Sciurotamias davidianus* 27
竹鼠科 Rhizomyidae 29
中华竹鼠 *Rhizomys sinensis* 29
豪猪科 Hystricidae 31
豪猪 *Hystrix brachyura* 31

■ 鸟类 BIRDS 33

▸ 鸡形目 GALLIFORMES 35
雉科 Phasianidae 35
血雉 *Ithaginis cruentus* 37
红腹角雉 *Tragopan temminckii* 39
勺鸡 *Pucrasia macrolopha* 41
红腹锦鸡 *Chrysolophus pictus* 43

▸ 雀形目 PASSERIFORMES 45
绣眼鸟科 Zosteropidae 45
白领凤鹛 *Yuhina diademata* 45
噪鹛科 Leiothrichidae 47
斑背噪鹛 *Garrulax lunulatus* 47

橙翅噪鹛 *Trochalopteron elliotii* 49
黑顶噪鹛 *Garrulax affinis* 51
鹡鸰科 Motacillidae 53
灰鹡鸰 *Motacilla cinerea* 53
燕雀科 Fringillidae 55
酒红朱雀 *Carpodacus vinaceus* 55

兽类

Mammals

名称：川金丝猴

学名：*Rhinopithecus roxellana*

国家I级 EN（濒危）—中国特有

形态特征

体型中等猴类。鼻孔向上仰，颜面部为蓝色，无颊囊。颊部及颈侧棕红，肩背具长毛，色泽金黄，尾与体等长或更长。成年雄体长平均为680mm，尾长685mm。

分布习性

典型的森林树栖动物，常年栖息于海拔1500-3300m的森林中。其植被类型和垂直分布带属亚热带山地常绿、落叶阔叶混交林、亚热带落叶阔叶林和常绿针叶林以及次生性的针阔叶混交林等四个植被类型，随着季节的变化，它们不向水平方向迁移，只在栖息的生境 中作垂直移动。群栖生活，每个大的集群是按家族性的小集群为活动单位。

俗名

果然兽、马绒、仰鼻猴“喜或嘉”（藏）、线绒、狮子鼻猴、 长尾子、金绒猴、蓝面猴、金线猴。

灵长目 PRIMATES 猴科 Cercopithecidae

名称：黑熊

学名：*Ursus thibetanus*

国家II级 VU（易危）

形态特征

毛被漆黑色。胸部具有白色或黄白色月牙形斑纹；头宽而圆，吻鼻部棕褐色或赭色，下颏白色。颈的两侧具丛状长毛。胸部毛短，一般短于4cm。前足腕垫发达，与掌垫相连；前后足皆5趾，爪强而弯曲，不能伸缩。

分布习性

典型的森林树栖动物，常年栖息于海拔1500-3300m的森林中。其植被类为林栖动物，主要栖息于阔叶林和针阔混交林中，南方的热带雨林和东北的柞树林都有栖息。在西藏东南部谷地，从低海拔的常绿阔叶林、季雨林，到海拔4000m左右的山地寒温带针叶林都有它们踪迹。

俗名

狗熊、黑瞎子、亚洲黑熊、狗驼子。

食肉目 CARNIVORA　熊科 Ursidae

名称：大熊猫

学名：*Ailuropoda melanoleuca*

国家I级 VU（易危） 中国特有

形态特征

大熊猫体型肥硕似熊，但头圆尾短，头部和身体毛色黑白相间分明。

分布习性

大熊猫栖长江上游各山系的高山深谷，为东南季风的迎风面，气候温凉潮湿，其湿度常在80%以上。活动的区域多在坳沟、山腹洼地、河谷阶地等，一般在20°以下的缓坡地形。除发情期外，常过着独栖生活，昼夜兼行。

俗名

貘、大猫熊、白熊、“杜洞”（藏）、竹熊、“峨曲”（彝）、花熊。

食肉目 CARNIVORA　熊科 Ursidae

名称：黄喉貂

学名：*Martes flavigula*



国家II级

形态特征

体形似果子狸，但躯体较细长，头和尾均呈黑褐色，体重约2kg。体背前半部棕黄色，后半部黄褐色；喉、胸部腹面鲜橙黄色，腹毛灰白色；四肢棕褐色。尾长超过体长之半。

分布习性

栖居山林，各种林型均能适应，居住树洞或岩穴中。

俗名

青鼬、密狗、黄腰狸、黄颈黄鼬、黄鼪、看山虎、蜜狗。

食肉目 CARNIVORA　鼬科 Mustelidae

名称：黄鼬

学名：*Mustela sibirica*

形态特征

体形细长，四肢短，头小而颈长；雄体比雌体明显大，雄性成体体重700g左右，雌性仅约500g。耳壳短宽，尾长为体长之半，肛门腺发达，四肢五趾间有很小的皮膜，冬季尾毛长而蓬松。体毛基本为棕色，可因不同地方和不同季节而有深浅变化；腹毛稍浅淡，背腹毛色无明显的分界；鼻垫基部及上、下唇为白色，喉部及颈下常有白斑。夏毛颜色较深，几呈褐色。

分布习性

栖息环境多样，平原、丘陵、山区、高原的各种生境均有分布，尤以平原地区数量大，甚至可在村庄、乡镇和城市中生存、繁殖。

俗名

黄鼠狼、黄狼。

食肉目 CARNIVORA　鼬科 Mustelidae

名称：花面狸

学名：*Paguma larvata*

形态特征

外形像椰子猫，但较肥胖，体重4~8 kg。足趾、足垫、香腺的结构基本与椰子猫相似，但颜面部有明显的白斑，头额中央的一条白纹最显著而成“花面”；身上无斑纹，体背和四肢多为灰棕色或棕黄色，腹部浅黄色；尾两色，尾端黑色，其余同体色。

分布习性

喜在石山丛林中生活，居岩洞、石隙，树洞或灌丛中。

俗名

青徭、果子狸、玉面狸、牛尾狸。

食肉目 CARNIVORA　灵猫科 Viverridae

名称：豹猫

学名：***Prionailurus bengalensis***

形态特征

略比家猫大，体重2-3kg，体长400-600mm，尾长超过体长的一半，为220-400mm。头形圆。两眼内侧至额后各有一条白色纹，从头顶至肩部有四条黑褐色点斑，耳背具有淡黄色斑，体背基色为棕黄色或淡棕黄色，胸腹部及四肢内侧白色，尾背有褐斑点或半环，尾端黑色或暗棕色。

分布习性

主要栖息于山地林区、郊野灌丛和林缘村寨附近。分布的海拔高度可从低海拔海岸带一直分布到海拔3000m高山林区。在半开阔的稀树灌丛生境中数量最多，干旱荒漠、沙丘几无分布。窝穴多在树洞、土洞、石块下或石缝中。



俗名

石虎、麻狸、野猫、抓鸡虎、狸子、狸猫、山狸、钱猫。

食肉目 CARNIVORA　猫科 Felidae

名称：野猪

学名：*Sus scrofa*

形态特征

野猪平均体长为1.5-2米（不包括尾长），肩高90厘米左右，体重90-200千克，不同地区所产的大小也有不同,甚至达到将近400千克。远东地区产的野猪体重毛色呈深褐色或黑色，年老的背上会长白毛，但也有地区性差异，在中亚地区曾有白色的野猪出现。背上有长而硬的鬃毛。毛粗而稀，冬天的毛会长得较密。

分布习性

栖息于山地、丘陵、荒漠、森林、草地和林丛间，环境适应性极强。野猪栖息环境跨越温带与热带，从半干旱气候至热带雨林、温带林地、草原等都有其踪迹，但就是没有在极干旱，海拔极高，与极寒冷的地区出没。

俗名

山猪。



偶蹄目 ARTIODACTYLA　猪科 Suidae

名称：毛冠鹿

学名：*Elaphodus cephalophus*

NT（近危） 中国特有

形态特征

体型似麂，体重16~28kg；体毛青灰色，尾背面黑色，腹面白色，很象黑麂，但额顶部有马蹄形黑色冠毛（黑麂为棕色）；雄性有角，但很短小，角冠不分叉，其长度仅1cm左右;无额腺，但眶下腺特别发达。

分布习性

主要栖息于常绿阔叶林，针阔混交林、灌丛、采伐迹地及河谷灌丛等生境，有时进入山区农家田园取食。在江南丘陵地区，一般分布在海拔300~800米的林区；在秦岭大巴山地区及云贵高原，栖息高度多在1000~3000米之间，最高高度的记录为4570米。白天多隐于林内灌丛或竹林中，晨昏活动。

俗名

黑麂、乌麂、青麂。



偶蹄目 ARTIODACTYLA　鹿科 Cervidae

名称：羚牛

学名：*Budorcas taxicolor*



国家I级 VU（易危）

形态特征

成兽体重300-600kg，全长2m左右。体型庞大粗重，四肢粗笨，肩高大于臀高，尾短，约10-15cm。体为淡棕褐-灰褐，吻、背及臀有黑色斑驳；背中具灰黑色脊纹。鼻部大而裸露。喉具长毛(俗称"羊胡子")，额具由上而后转向外后的扭形角。

分布习性

栖息于海拔1500-3600m的针阔混交林、亚高山针叶林和高山灌丛草甸，晨昏采食。

俗名

食盐兽（川北县志）、藏羚牛、“弄”（藏）、四川羚牛、扭角羚、野山牛、野牛（川西）、“勒依尼”（彝）、封牛（川西）、山牛（甘肃）、盘头羊。



偶蹄目 ARTIODACTYLA 牛科 Bovidae

名称：斑羚

学名：*Naemorhedus goral*

国家II级 NT（近危）

形态特征

体形较小，平均体长1000毫米左右，肩高约510毫米。颌下无须。雌雄两性均具角，角长128-150毫米，上体棕褐或灰褐色；喉斑白色或棕白色；整个下体色调基本上与上体相似，但略淡而稍灰；鼠蹊部污白、棕白色；尾黑色。

分布习性

典型的林栖兽类，栖息生境多样，从亚热带至北温带地区均有分布，可见于山地针叶林、山地针阔叶混交林和山地常绿阔叶林，但未见于热带森林中。常在密林间的陡峭崖坡出没，并在崖石旁、岩洞或丛竹间的小道上隐蔽。

俗名

野山羊、麻羊、青羊、灰包羊。



偶蹄目 ARTIODACTYLA　牛科 Bovidae

名称：鬣羚

学名：*Capricornis sumatraensis*

国家II级 VU（易危）

偶蹄目 ARTIODACTYLA 牛科 Bovidae

形态特征

体型中等，体长140cm左右。耳廓发达，耳长16-17cm。眶下腺大而明显。头后、颈背具长的鬣毛。上体褐灰、灰白或黑色。腋下和鼠鼷部呈锈黄色或棕白色。四肢腿部外侧为黑灰锈色或栗棕色。尾色与上体色调相同。

分布习性

主要生活于热带雨林和亚热带常绿阔叶林带；在青藏高原山区，多栖于2000-3000m间的亚热带阔叶林及暖温带针阔混交林。平时常在林间大树旁或巨岩下隐蔽和休息。以草类、树叶、菌类和松萝为食。

俗名

山羊、明鬃羊、苏门羚、岩骡、山驴子、大岩羊。



名称：岩松鼠

学名：*Sciurotamias davidianus*

形态特征

体背面呈暗灰带黄褐色；体腹面橙黄微带浅黄色或呈浅黄褐色；尾蓬松，上面、两侧和远端有明显的白色毛尖，下面中央黄褐色；眼眶浅黄白色至淡黄褐色；耳内外侧均有黑褐色毛，耳后有一白斑，向后延伸至颈部两侧，分别形成一不甚明显的白色短纹；喉部通常有一白斑；后足背面与体背面毛色相似或呈黑色，后足足底被以密毛，无长形蹠垫。

分布习性

栖息于多岩石山区。营地栖生活，但也善于攀爬树木。常在昼间活动。在岩石缝隙中穴居筑巢。以坚果、种子为食，能窃食谷物等农作物，对农林有一定害处。

俗名

岩鼠、石松鼠。



啮齿目 RODENTIA　松鼠科 Sciuridae

名称：中华竹鼠

学名：*Rhizomys sinensis*

形态特征

体型比银星竹鼠小，尾较短，远不及体长的一半，且几乎完全裸露无毛。眼小，耳隐于体毛中，前后足爪坚硬；体毛细密而柔软，单毛基部灰色，背部呈浅灰褐色或粉红灰色，腹部颜色较淡。

分布习性

山区竹林和芒草丛生处。

俗名

灰竹鼠、芒鼠。

啮齿目 RODENTIA　竹鼠科 Rhizomyidae

名称：豪猪

学名：*Hystrix brachyura*

形态特征

较大型的啮齿动物，体形粗壮，全身披棘刺，颈脊有鬣状长毛；尾短，隐于棘刺中，尾毛特化为管状，俗称“尾铃”；棘刺呈纺锤形，两端白色，中间为黑色；体腹面及四肢的刺短小而软。在全身硬刺中间，夹杂有疏稀的长白毛。

分布习性

山地草坡、灌丛或树林中。

俗名

普通豪猪、箭猪。

啮齿目 RODENTIA　豪猪科 Hystricidae

鳥类
Birds

名称：血雉

学名：*Ithaginis cruentus*

国家II级

形态特征

体小（46厘米），似鹑类，具矛状长羽，冠羽蓬松，脸与腿猩红，翼及尾沾红的雉种。头近黑，具近白色冠羽及白色细纹。上体多灰带白色细纹，下体沾绿色。胸部红色多变。雌鸟色暗且单一，胸为皮黄色。

分布习性

地方性常见鸟，分布于海拔3200~4700米处。

俗名

柳鸡、绿鸡、松花鸡、松花鸡、薮鸡、太白鸡、血鸡。

鸡形目 GALLIFORMES　雉科 Phasianidae

名称：红腹角雉

学名：*Tragopan temminckii*

国家II级

形态特征

体大（68厘米）而尾短。雄鸟绯红，上体多有带黑色外缘的白色小圆点，下体带灰白色椭圆形点斑。头黑，眼后有金色条纹，脸部裸皮蓝色，具可膨胀的喉垂及肉质角。与红胸角雉区别在于下体灰白色点斑较大且不带黑色外缘。雌鸟较小，具棕色杂斑，下体有大块白色点斑。

分布习性

单个或家族栖于亚高山林的林下。不惧生。夜栖枝头。雄鸟炫耀时膨胀喉垂并竖起蓝色肉质角，喉垂完全膨起时有蓝红色图案。

鸡形目 GALLIFORMES　雉科 Phasianidae

名称：勺鸡

学名：*Pucrasia macrolopha*

国家II级

形态特征

体大（61厘米）而尾相对短的雉类。具明显的飘逸型耳羽束。雄鸟：头顶及冠羽近灰；喉、宽阔的眼线、枕及耳羽束金属绿色；颈侧白；上背皮黄色；胸栗色；其他部位的体羽为长的白色羽毛上具黑色矛状纹。雌鸟：体型较小，具冠羽但无长的耳羽束；体羽图纹与雄鸟同。

分布习性

罕见，北方和南方的分布范围均有。常单独或成对。遇警情时深伏不动，不易被赶。

俗名

刁鸡、松鸡。

鸡形目 GALLIFORMES　雉科 Phasianidae

名称：红腹锦鸡

学名：*Chrysolophus pictus*



国家II级 中国特有

形态特征

雄鸟：体型显小但修长（98厘米），头顶及背有耀眼的金色丝状羽；枕部披风为金色并具黑色条纹；上背金属绿色，下体绯红。翼为金属蓝色，尾长而弯曲，中央尾羽近黑而具皮黄色点斑，其余部位黄褐色。雌鸟体型较小，为黄褐色，上体密布黑色带斑，下体淡皮黄色。

分布习性

单独或成小群活动，喜有矮树的山坡及次生的亚热带阔叶林及落叶阔叶林。常被驯养。

俗名

采鸡、金鸡、锦鸡。

鸡形目 GALLIFORMES　雉科 Phasianidae

名称：白领凤鹛

学名：*Yuhina diademata*

形态特征

体大（17.5厘米）的烟褐色凤鹛。具蓬松的羽冠，颈后白色大斑块与白色宽眼圈及后眉线相接。颏、鼻孔及眼先黑色。飞羽黑而羽缘近白。下腹部白色。

分布习性

成对或结小群吵嚷活动于海拔1100~3600米的灌丛，冬季下至海拔800米。

雀形目 PASSERIFORMES 绣眼鸟科 Zosteropidae

名称：斑背噪鹛

学名：*Garrulax lunulatus*

形态特征

体型略小（23厘米）的暖褐色噪鹛。具明显的白色眼斑，上体(除头顶)及两胁具醒目的黑色及草黄色鳞状斑纹。初级飞羽及外侧尾羽的羽缘灰色。尾端白色，具黑色的次端横斑。与白颊噪鹛的区别在上体具黑色横斑。

分布习性

群栖于阔叶林及针叶林和林下竹丛。

雀形目 PASSERIFORMES 噪鹛科 Leiothrichidae

名称：眼纹噪鹛

学名：*Garrulax ocellatus*

形态特征

体大（31厘米）的噪鹛。顶冠、颈背及喉黑色，上体及胸侧具粗重点斑。眼先、眼下及颏浅皮黄色而与黑色的头成对比。上体褐，各羽的次端黑而端白形成月牙形点斑。翼羽羽端白色形成明显的翼斑，尾端白色。西藏南部的亚种耳羽栗色。与大噪鹛的区别在尾较短且喉为黑色。

分布习性

不罕见于海拔1100~3100米的多林山区。成对或结小群于腐叶间找食。有时与其他噪鹛混群。



雀形目 PASSERIFORMES 噪鹛科 Leiothrichidae

名称：橙翅噪鹛

学名：*Trochalopteron elliotii*

形态特征

中等体型（26厘米）的噪鹛。全身大致灰褐色，上背及胸羽具深色及偏白色羽缘而成鳞状斑纹。脸色较深。臀及下腹部黄褐。

分布习性

结小群于开阔次生林及灌丛的林下植被及竹丛中取食。

雀形目 PASSERIFORMES 噪鹛科 Leiothrichidae

名称：黑顶噪鹛

学名：*Trochalopteron affinis*



形态特征

中等体型（26厘米）的深色噪鹛。具白色宽髭纹，颈部白色块与偏黑色的头成对比。诸亚种体羽略有差异，但一般为暗橄榄褐色，翼羽及尾羽羽缘带黄色。

分布习性

亚种众多。栖于混合林、杜鹃林及桧树丛，藏隐于林下植被。



雀形目 PASSERIFORMES 噪鹛科 Leiothrichidae

名称：灰鹡鸰

学名：*Motacilla cinerea*

形态特征

中等体型（19厘米）而尾长的偏灰色鹡鸰。腰黄绿色，下体黄。与黄鹡鸰的区别在上背灰色，飞行时白色翼斑和黄色的腰显现，且尾较长。成鸟下体黄，亚成鸟偏白。

分布习性

常光顾多岩溪流并在潮湿砾石或沙地觅食，也于最高山脉的高山草甸上活动。



雀形目 PASSERIFORMES 鹡鸰科 Motacillidae

名称：酒红朱雀

学名：*Carpodacus vinaceus*

形态特征

体型略小（15厘米）的深色朱雀。雄鸟：全身深绯红色，腰色较淡，眉纹及三级飞羽羽端浅粉色。较其他朱雀色深；较点翅朱雀体小；较暗胸朱雀或曙红朱雀喉色深。雌鸟：橄榄褐色而具深色纵纹；三级飞羽羽端浅皮黄色而有别于暗胸朱雀或赤朱雀。

分布习性

为不常见鸟，见于海拔2000~3400米的山坡竹林及灌丛。单独或结小群活动，常近地面。可长时间静立不动。

雀形目 PASSERIFORMES 燕雀科 Fringillidae