

支持单位

汇丰银行(中国)有限公司

欧莱雅(中国)有限公司



图片来源：红外相机及调查照片

资料来源：中国野鸟图库、中国动物主题数据库、中国鸟类分类与分布名录(第三版)、
IUCN Red List of Threatened Species

制作：山水自然保护中心

本手册只作非商业盈利使用

山水自然保护中心
甘肃白水江国家级自然保护区



李子坝物种名录手册

SPECIES LIST OF LIZIBA VILLAGE


2019

前言

李子坝村属白水江国家级自然保护区碧口保护站辖区，位于保护区和甘肃省地理位置的最南端，是白水江国家级自然保护区内唯一地处摩天岭南坡的村庄；全村总面积6500公顷，均属保护区管辖范围，其中核心区2412公顷，缓冲区1944公顷，试验区2144公顷。全村拥有48700亩集体林，与保护区内其它社区相比，这里的自留林相对充裕，基本能够满足家庭燃料需求。李子坝村辖马家湾、磨子坪、青树子、青崖关、杜家院、茶园、王家院、水沟边、马家桥等九个社，全村有700多人，约4500亩耕地，户均约20亩，几乎全部用作种茶。

2008年，“512”地震让村子受到重创，北京山水自然保护中心及兰州大学社区与生物多样性保护研究中心进入，支持李子坝村灾后重建和生态保护，山水支持李子坝开展协议保护项目进一步完善了巡护队和内部资源管理制度促进李子坝村生态保护工作的发展，取得了良好的保护成效。

此图册将近几年李子坝红外相机拍摄到的和调查过程中拍摄到的动物图片整理成册，并按照动物名录顺序制作，动物描述来源于中国动物主题数据库和中国野鸟图库。只做展示，如有遗漏，敬请指正。



李子坝村位置示意图

目录 CONTENTS

■ 兽类 MAMMALS

01

▶ 灵长目 PRIMATES

猴科 Cercopithecidae

藏酋猴 *Macaca thibetana*

03

川金丝猴 *Rhinopithecus roxellana*

05

▶ 食肉目 CARNIVORA

熊科 Ursidae

黑熊 *Ursus thibetanus*

07

大熊猫 *Ailuropoda melanoleuca*

09

鼬科 Mustelidae

黄喉貂 *Martes flavigula*

11

黄鼬 *Mustela sibirica*

13

灵猫科 Viverridae

花面狸 *Paguma larvata*

15

猫科 Felidae

豹猫 *Prionailurus bengalensis*

17

▶ 偶蹄目 ARTIODACTYLA

猪科 Suidae

野猪 *Sus scrofa*

19

麝科 Moschidae

林麝 *Moschus berezovskii*

21

鹿科 Cervidae

毛冠鹿 *Elaphodus cephalophus*

23

小麂 *Muntiacus reevesi*

25

牛科 Bovidae

羚牛 *Budorcas taxicolor*

27

斑羚 *Naemorhedus goral*

29

鬃羚 *Capricornis sumatraensis*

31

▶ 啮齿目 RODENTIA

松鼠科 Sciuridae

岩松鼠 *Sciurotamias davidianus*

33

豪猪科 Hystricidae

豪猪 *Hystrix brachyura*

35

■ 鸟类 BIRDS

37

▶ 鸡形目 GALLIFORMES

雉科 Phasianidae

灰胸竹鸡 *Bambusicola thoracica*

39

血雉 *Ithaginis cruentus*

41

红腹角雉 *Tragopan temminckii*

43

勺鸡 *Pucrasia macrolopha*

45

蓝马鸡 *Crossoptilon auritum*

47

红腹锦鸡 *Chrysolophus pictus*

49

▶ 鸢形目 PICIFORMES

啄木鸟科 Picidae

大斑啄木鸟 *Dendrocopos major*

51

▸ 鸮形目 STRIGIFORMES	
<u>鸱鸺科 Strigidae</u>	
灰林鸮 <i>Strix aluco</i>	53
▸ 鸽形目 COLUMBIFORMES	
<u>鸠鸽科 Columbidae</u>	
山斑鸠 <i>Streptopelia orientalis</i>	55
▸ 雀形目 PASSERIFORMES	
<u>鸦科 Corvidae</u>	
红嘴蓝鹊 <i>Urocissa erythrorhyncha</i>	57
小嘴乌鸦 <i>Corvus corone</i>	59
<u>山雀科 Paridae</u>	
绿背山雀 <i>Parus monticolus</i>	61
<u>鹟莺科 Sylviidae</u>	
三趾鸦雀 <i>Cholornis paradoxus</i>	63
<u>噪鹛科 Leiothrichidae</u>	
眼纹噪鹛 <i>Garrulax ocellatus</i>	65
白喉噪鹛 <i>Garrulax albogularis</i>	67
橙翅噪鹛 <i>Trochalotheon elliotii</i>	69
红翅噪鹛 <i>Trochalotheon formosus</i>	71
<u>鸫科 Turdidae</u>	
灰翅鸫 <i>Turdus boulboul</i>	73
宝兴歌鸫 <i>Turdus mupinensis</i>	75
<u>鹟科 Muscicapidae</u>	
金色林鸫 <i>Tarsiger chrysaeus</i>	77
白顶溪鸫 <i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	79
紫啸鸫 <i>Corvus corone</i>	81

<u>岩鹟科 Prunellidae</u>	
领岩鹟 <i>Prunella collaris</i>	83
<u>燕雀科 Fringillidae</u>	
黄颈拟蜡嘴雀 <i>Mycerobas affinis</i>	85

■ 两栖爬行类 AMPHIBIANS 87

▸ 有鳞目 SQUAMATA	
<u>蝰科 Viperidae</u>	
山烙铁头 <i>Trimeresurus monticola</i>	89

■ 鱼类 FISHES 91

▸ 鲤形目 CYPRINIFORMES	
<u>鲤科 Cyprinidae</u>	
宽鳍鱲 <i>Zacco platypus</i>	93
▸ 鲇形目 SILURIFORMES	
<u>鮡科 Sisoriidae</u>	
石爬鮡 <i>Euchiloglanis spp.</i>	95



兽类

Mammals



名称：藏酋猴 [zāng qiú hóu]

学名： *Macaca thibetana*



国家II级 NT (近危) 中国特有

形态特征


猕猴属最大的一种猴，雄猴平均体重15kg，最重的可达30kg以上。身体粗壮，尾较短，不及后脚之长。背毛棕褐，暗棕褐或黑褐色，胸部浅灰，腹毛淡黄色。颜面部仔猴为肉色，幼年白色，成年鲜红，老年转为紫色具黑斑或为黑色。

分布习性

它们栖息的生境是在高山峡谷的阔叶林、针阔混交林或稀树多岩的地方。群栖，一般为40~50只。杂食性，但以植物为主，也吃昆虫、蛙类、小鸟和鸟蛋等动物性食物。

俗名

断尾猴、青猴、毛面短尾猴、藏猕猴、红面猴、四川猴、四川短尾猴、“治乌阿格”（藏）、马猴、“女诺”（彝）。



灵长目 PRIMATES 猴科 Cercopithecidae

名称：川金丝猴 [chuān jīn sī hóu]

学名： *Rhinopithecus roxellana*



国家I级 EN (濒危) 中国特有

形态特征

体型中等猴类。鼻孔向上仰，颜面部为蓝色，无颊囊。颊部及颈侧棕红，肩背具长毛，色泽金黄，尾与体等长或更长。成年雄体长平均为680mm，尾长685mm。

分布习性

典型的森林树栖动物，常年栖息于海拔1500-3300m的森林中。其植被类型和垂直分布带属亚热带山地常绿、落叶阔叶混交林、亚热带落叶阔叶林和常绿针叶林以及次生性的针阔叶混交林等四个植被类型，随着季节的变化，它们不向水平方向迁移，只在栖息的生境中作垂直移动。群栖生活，每个大的集群是按家族性的小集群为活动单位。

俗名

果然兽、马绒、仰鼻猴“喜或嘉”（藏）、线绒、狮子鼻猴、长尾子、金绒猴、蓝面猴、金线猴。



灵长目 PRIMATES 猴科 Cercopithecidae

名称：黑熊 [hēi xióng]

学名： *Ursus thibetanus*



国家II级 VU (易危)

形态特征

毛被漆黑色。胸部具有白色或黄白色月牙形斑纹；头宽而圆，吻鼻部棕褐色或赭色，下颏白色。颈的两侧具丛状长毛。胸部毛短，一般短于4cm。前足腕垫发达，与掌垫相连；前后足皆5趾，爪强而弯曲，不能伸缩。

分布习性

典型的森林树栖动物，常年栖息于海拔1500-3300m的森林中。其植被类为林栖动物，主要栖息于阔叶林和针阔混交林中，南方的热带雨林和东北的柞树林都有栖息。在西藏东南部谷地，从低海拔的常绿阔叶林、季雨林，到海拔4000m左右的山地寒温带针叶林都有它们踪迹。

俗名

狗熊、黑瞎子、亚洲黑熊、狗驼子。



食肉目 CARNIVORA 熊科 Ursidae

名称：大熊猫 [dà xióng māo]

学名： *Ailuropoda melanoleuca*



国家级 VU (易危) 中国特有

形态特征

大熊猫体型肥硕似熊，但头圆尾短，头部和身体毛色黑白相间分明。

分布习性

大熊猫栖长江上游各山系的高山深谷，为东南季风的迎风面，气候温凉潮湿，其湿度常在80%以上。活动的区域多在坳沟、山腹洼地、河谷阶地等，一般在20°以下的缓坡地形。除发情期外，常过着独栖生活，昼夜兼行。

俗名

獾、大猫熊、白熊、“杜洞”（藏）、竹熊、“峨曲”（彝）、花熊。



食肉目 CARNIVORA 熊科 Ursidae

名称：黄喉貂 [huáng hóu diāo]

学名： *Martes flavigula*



国家II级

形态特征

体形似果子狸，但躯体较细长，头和尾均呈黑褐色，体重约2kg。体背前半部棕黄色，后半部黄褐色；喉、胸部腹面鲜橙黄色，腹毛灰白色；四肢棕褐色。尾长超过体长之半。

分布习性

栖居山林，各种林型均能适应，居住树洞或岩穴中。

俗名

密狗、黄腰狸、黄颈黄鼬、黄鼬、看山虎、蜜狗。



食肉目 CARNIVORA 鼬科 Mustelidae

名称：猪獾 [zhū huān]

学名： *Arctonyx collaris*



VU (易危)

形态特征

外形和大小酷似狗獾，体重10kg以上，体长650~700mm。体毛黑褐色，间杂灰白色针毛；与狗獾的主要区别为鼻垫与上唇间裸露，鼻吻部狭长而圆似猪鼻。从前额到额顶中央有一条短宽的白色条纹，并向后延伸至颈背；两颊在眼下各具一条污白色条纹；下颌及喉部白色，向后延伸几达肩部。毛色因地区不同常有变化。

分布习性

活习性与狗獾基本相似，穴居，住岩洞或掘洞而居。性凶猛，叫声似猪；视觉差，嗅觉发达；夜行性。

俗名

沙獾、拱猪（四川）、串猪（甘肃）、川猪、猪鼻獾（江苏）、猪鼻獾、獾猪。



食肉目 CARNIVORA 鼬科 Mustelidae

名称：豹猫 [bào māo]

学名： *Prionailurus bengalensis*



形态特征

略比家猫大，体重2-3kg，体长400-600mm，尾长超过体长的一半，为220-400mm。头形圆。两眼内侧至额后各有一条白色纹，从头顶至肩部有四条黑褐色点斑，耳背具有淡黄色斑，体背基色为棕黄色或淡棕黄色，胸腹部及四肢内侧白色，尾背有褐斑点或半环，尾端黑色或暗棕色。

分布习性

主要栖息于山地林区、郊野灌丛和林缘村寨附近。分布的海拔高度可从低海拔海岸带一直分布到海拔3000m高山林区。在半开阔的稀树灌丛生境中数量最多，干旱荒漠、沙丘几无分布。窝穴多在树洞、土洞、石块下或石缝中。

俗名

石虎、麻狸、野猫、抓鸡虎、狸子、狸猫、山狸、钱猫。



食肉目 CARNIVORA 猫科 Felidae

名称：亚洲金猫 [yà zhōu jīn māo]

学名： *Catopuma temminckii*



国家II级

形态特征


中型猫类，貌似豹，体长75-100cm，尾长34-56cm，体重10kg左右。两眼内角各有宽的白色或黄白色条纹，至头顶转为红棕色，棕色纹两侧各有细黑纹伴衬；面颊两侧有白色和深色相间的条纹；四肢上部有斑点。体色多样，至少有三类色型。图为灰棕色色型背部有斑纹。

分布习性

栖于亚洲热带、亚热带山地各种森林中，从湿润的常绿林到海拔3000m左右的干旱针阔混交林或针叶林都有金猫的活动，也偶见于灌丛和草地。常单独生活，白天栖于树上洞穴内，夜间下地活动。

俗名

狸猫、红春豹、黄虎、原猫、芝麻豹。



食肉目 CARNIVORA 猫科 Felidae

名称：野猪 [yě zhū]

学名： *Sus scrofa*



形态特征


野猪平均体长为1.5-2米（不包括尾长），肩高90厘米左右，体重90-200千克，不同地区所产的大小也有不同,甚至达到将近400千克。远东地区产的野猪体重毛色呈深褐色或黑色，年老的背上会长白毛，但也有地区性差异，在中亚地区曾有白色的野猪出现。背上有长而硬的鬃毛。毛粗而稀，冬天的毛会长得较密。

分布习性

栖息于山地、丘陵、荒漠、森林、草地和林丛间，环境适应性极强。野猪栖息环境跨越温带与热带，从半干旱气候至热带雨林、温带林地、草原等都有其踪迹，但就是没有在极干旱，海拔极高，与极寒冷的地区出没。

俗名

山猪。



偶蹄目 ARTIODACTYLA 猪科 Suidae

名称：林麝 [lín shè]

学名： *Elaphodus cephalophus*



国家I级 EN (濒危)

形态特征


体重7~9kg，成体毛色全身暗褐色，没有斑点，臀部毛色更深，颈下纹明显。耳背端毛色褐色。尾短，隐于毛丛中，不外裸露。

分布习性

主要栖于针阔混交林，也适于在针叶林和郁闭度较差的阔叶林的生境生活。栖息高度可达2000~3800米，但低海拔环境也能生存。

俗名

獐子、香獐。



偶蹄目 ARTIODACTYLA 麝科 Moschidae

名称：毛冠鹿 [máo guàn lù]

学名： *Elaphodus cephalophus*



NT (近危) 中国特有

形态特征


体型似麂，体重16~28kg；体毛青灰色，尾背面黑色，腹面白色，很象黑麂，但额顶部有马蹄形黑色冠毛（黑麂为棕色）；雄性有角，但很短小，角冠不分叉，其长度仅1cm左右；无额腺，但眶下腺特别发达。

分布习性

主要栖息于常绿阔叶林，针阔混交林、灌丛、采伐迹地及河谷灌丛等生境，有时进入山区农家田园取食。在江南丘陵地区，一般分布在海拔300~800米的林区；在秦岭大巴山地区及云贵高原，栖息高度多在1000~3000米之间，最高高度的记录为4570米。白天多隐于林内灌丛或竹林中，晨昏活动。

俗名

乌麂、青麂。



偶蹄目 ARTIODACTYLA 鹿科 Cervidae

名称：小麂 [xiǎo jǐ]

学名： *Muntiacus reevesi*



形态特征


为鹿属中体型最小的种类，成体体重仅10~15kg。雄鹿有角，角柄长约4cm，角冠长约7cm，仅分1~2cm的小叉；雄性也有獠牙，但较粗短；两性有额腺和眶下腺；毛色多变异，一般上体棕黄色，但有的沙黄色，有的暗棕色，额腺两侧至角柄内侧有一条棕黑色条纹。雌性两侧黑纹在额顶会合成棱状六角形，顶端黑纹延伸到颈背，尾背毛与背部同色，尾腹面及腹部白色。头骨略呈三角形，前颌骨与鼻骨分离。

分布习性

栖于气候温暖的低山丘陵多灌丛的地区。长期积雪和冰冻的环境是它向北扩散的限制因素。积雪影响黄麂活动，一般积雪厚度超过10cm时，黄麂为避开深雪和寻找食物而下移。

俗名

黄麂、角麂、麻麂、黄獐。



偶蹄目 ARTIODACTYLA 鹿科 Cervidae

名称：羚牛 [líng niú]

学名： *Budorcas taxicolor tibetana*



国家I级 VU (易危)

形态特征


成兽体重300-600kg，全长2m左右。体型庞大粗重，四肢粗笨，肩高大于臀高，尾短，约10-15cm。体为淡棕褐-灰褐，吻、背及臀有黑色斑驳；背中具灰黑色脊纹。鼻部大而裸露。喉具长毛(俗称"羊胡子")，额具由上而后转向外后的扭形角。

分布习性

栖息于海拔1500-3600m的针阔混交林、亚高山针叶林和高山灌丛草甸，晨昏采食。

俗名

食盐兽（川北县志）、藏羚牛、“弄”（藏）、四川羚牛、扭角羚、野山牛、野牛（川西）、“勒依尼”（彝）、封牛（川西）、山牛（甘肃）、盘头羊。



偶蹄目 ARTIODACTYLA 牛科 Bovidae

名称：斑羚 [bān líng]

学名： *Naemorhedus goral*



国家II级 NT (近危)

形态特征


体形较小，平均体长1000毫米左右，肩高约510毫米。颌下无须。雌雄两性均具角，角长128-150毫米，上体棕褐或灰褐色；喉斑白色或棕白色；整个下体色调基本上与上体相似，但略淡而稍灰；鼠蹊部污白、棕白色；尾黑色。

分布习性

典型的林栖兽类，栖息生境多样，从亚热带至北温带地区均有分布，可见于山地针叶林、山地针阔叶混交林和山地常绿阔叶林，但未见于热带森林中。常在密林间的陡峭崖坡出没，并在崖石旁、岩洞或丛竹间的小道上隐蔽。

俗名

野山羊、麻羊、青羊、灰包羊。



偶蹄目 ARTIODACTYLA 牛科 Bovidae

名称：鬘羚 [liè líng]

学名： *Capricornis sumatraensis*



国家II级 VU (易危)

形态特征

体型中等，体长140cm左右。耳廓发达，耳长16-17cm。眶下腺大而明显。头后、颈背具长的鬘毛。上体褐灰、灰白或黑色。腋下和鼠蹊部呈锈黄色或棕白色。四肢腿部外侧为黑灰锈色或栗棕色。尾色与上体色调相同。

分布习性

主要生活于热带雨林和亚热带常绿阔叶林带；在青藏高原山区，多栖于2000-3000m间的亚热带阔叶林及暖温带针阔混交林。平时常在林间大树旁或巨岩下隐蔽和休息。以草类、树叶、菌类和松萝为食。

俗名

山羊、明鬘羊、苏门羚、岩骡、山驴子、大岩羊。



偶蹄目 ARTIODACTYLA 牛科 Bovidae

名称：岩松鼠 [yán sōng shǔ]

学名： *Sciurotamias davidianus*



中国特有

形态特征

体背面呈暗灰带黄褐色；体腹面橙黄微带浅黄色或呈浅黄褐色；尾蓬松，上面、两侧和远端有明显的白色毛尖，下面中央黄褐色；眼眶浅黄白色至淡黄褐色；耳内外侧均有黑褐色毛，耳后有一白斑，向后延伸至颈部两侧，分别形成一不甚明显的白色短纹；喉部通常有一白斑；后足背面与体背面毛色相似或呈黑色，后足足底被以密毛，无长形蹠垫。

分布习性

栖息于多岩石山区。营地栖生活，但也善于攀爬树木。常在昼间活动。在岩石缝隙中穴居筑巢。以坚果、种子为食，能窃食谷物等农作物，对农林有一定害处。

俗名

岩鼠、石松鼠。



啮齿目 RODENTIA 松鼠科 Sciuridae

名称：豪猪 [háo zhū]

学名： *Hystrix brachyura*



形态特征

较大型的啮齿动物，体形粗壮，全身披棘刺，颈脊有鬃状长毛；尾短，隐于棘刺中，尾毛特化为管状，俗称“尾铃”；棘刺呈纺锤形，两端白色，中间为黑色；体腹面及四肢的刺短小而软。在全身硬刺中间，夹杂有疏稀的长白毛。

分布习性

山地草坡、灌丛或树林中。

俗名

普通豪猪、箭猪。



啮齿目 RODENTIA 豪猪科 Hystricidae



鸟类

Birds

名称：灰胸竹鸡 [huī xiōng zhú jī]

学名： *Bambusicola thoracica*



中国特有

形态特征

中等体型（33厘米）的红棕色鹑类。特征为额、眉线及颈项蓝灰色，与脸、喉及上胸的棕色成对比。上背、胸侧及两胁有月牙形的大块褐斑。亚种*sonorivox*的整个脸、颈侧及上胸灰蓝，仅颈及喉栗色。外侧尾羽栗色。飞行翼下有两块白斑。雄雌同色。

分布习性

以家庭群栖居。飞行笨拙、径直。活动于干燥的矮树丛、竹林灌丛，至海拔1000米处。

俗名

鸡头鹑、泥滑滑、山菌子、竹鸡、竹鹧鸪。



鸡形目 GALLIFORMES 雉科 Phasianidae

名称：血雉 [xuè zhì]

学名： *Ithaginis cruentus*



国家II级

形态特征

体小（46厘米），似鹑类，具矛状长羽，冠羽蓬松，脸与腿猩红，翼及尾沾红的雉种。头近黑，具近白色冠羽及白色细纹。上体多灰带白色细纹，下体沾绿色。胸部红色多变。雌鸟色暗且单一，胸为皮黄色。

分布习性

地方性常见鸟，分布于海拔3200~4700米处。

俗名

柳鸡、绿鸡、松花鸡、松花鸡、藪鸡、太白鸡、血鸡。



鸡形目 GALLIFORMES 雉科 Phasianidae

名称：红腹角雉 [hóng fù jiǎo zhì]

学名： *Tragopan temminckii*



国家II级

形态特征

体大（68厘米）而尾短。雄鸟绯红，上体多有带黑色外缘的白色小圆点，下体带灰白色椭圆形点斑。头黑，眼后有金色条纹，脸部裸皮蓝色，具可膨胀的喉垂及肉质角。与红胸角雉区别在于下体灰白色点斑较大且不带黑色外缘。雌鸟较小，具棕色杂斑，下体有大块白色点斑。

分布习性

单个或家族栖于亚高山林的林下。不惧生。夜栖枝头。雄鸟炫耀时膨胀喉垂并竖起蓝色肉质角，喉垂完全膨起时有蓝红色图案。



鸡形目 GALLIFORMES 雉科 Phasianidae

名称：勺鸡 [sháo jī]

学名： *Pucrasia macrolopha*



国家II级

形态特征

体大（61厘米）而尾相对短的雉类。具明显的飘逸型耳羽束。雄鸟：头顶及冠羽近灰；喉、宽阔的眼线、枕及耳羽束金属绿色；颈侧白；上背皮黄色；胸栗色；其他部位的体羽为长的白色羽毛上具黑色矛状纹。雌鸟：体型较小，具冠羽但无长的耳羽束；体羽图纹与雄鸟同。

分布习性

罕见，北方和南方的分布范围均有。常单独或成对。遇警情时深伏不动，不易被赶。

俗名

勺鸡、松鸡。



鸡形目 GALLIFORMES 雉科 Phasianidae

名称：蓝马鸡 [lán mǎ jī]

学名： *Crossoptilon auritum*



国家II级 中国特有

形态特征

体大（95厘米）的蓝灰色马鸡。具黑色天鹅绒式头盖，猩红色眼周裸皮及白色髭须延长成耳羽簇。枕后有一近白色横斑。尾羽弯曲，丝状中心尾羽灰色，与紫蓝色外侧尾羽成对比。此种在马鸡分布中为最西北。

分布习性

同其他种马鸡，以小群活动于高海拔的开阔高山草甸及桧树、杜鹃灌丛。

俗名

呼和-哈登哈日阿、角鸡、柳鸡、绿鸡、马鸡、松鸡。



鸡形目 GALLIFORMES 雉科 Phasianidae

名称：红腹锦鸡 [hóng fù jīn jī]

学名： *Chrysolophus pictus*



国家II级 中国特有

形态特征

雄鸟：体型显小但修长（98厘米），头顶及背有耀眼的金色丝状羽；枕部披风为金色并具黑色条纹；上背金属绿色，下体绯红。翼为金属蓝色，尾长而弯曲，中央尾羽近黑而具皮黄色点斑，其余部位黄褐色。雌鸟体型较小，为黄褐色，上体密布黑色带斑，下体淡皮黄色。

分布习性

单独或成小群活动，喜有矮树的山坡及次生的亚热带阔叶林及落叶阔叶林。常被驯养。

俗名

采鸡、金鸡、锦鸡。



鸡形目 GALLIFORMES 雉科 Phasianidae

名称：大斑啄木鸟 [dà bān zhuó mù niǎo]

学名： *Dendrocopos major*



形态特征

体型中等（24厘米）的常见型黑相间的啄木鸟。雄鸟枕部具狭窄红色带而雌鸟无。两性臀部均为红色，但带黑色纵纹的近白色胸部上无红色或橙红色。

分布习性

典型的本属特性，凿树洞营巢，吃食昆虫及树皮下的蛴螬。

俗名

白花啄木、白花啄木鸟、赤髯、臭嘴打木、叨木冠子、海南花啄木鸟、花嘴打木、花啄木。



鸟形目 PICIFORMES 啄木鸟科 Picidae

名称：灰林鸮 [huī lín xiāo]

学名： *Strix aluco*



国家II级

形态特征

中等体型（43厘米）的偏褐色鸮鸟。无耳羽簇，通体具浓红褐色的杂斑及棕纹，但也见偏灰个体。每片羽毛均具复杂的纵纹及横斑。上体有些许白斑，面庞之上有一偏白的“V”形。

分布习性

温带森林中最常见的鸮鸟。夜行性，白天通常在隐蔽的地方睡觉。有时被小型鸣禽发现和围攻。在树洞营巢。



鸮形目 STRIGIFORMES 鸱鸃科 Strigidae

名称：山斑鸠 [shān bān jiū]

学名： *Strix aluco*



形态特征

中等体型（32厘米）的偏粉色斑鸠。与珠颈斑鸠区别在于颈侧有带明显黑白色条纹的块状斑。上体的深色扇贝斑纹体羽羽缘棕色，腰灰，尾羽近黑，尾梢浅灰。下体多偏粉色，脚红色。与灰斑鸠区别在体型较大。

分布习性

成对活动，多在开阔农耕区、村庄及寺院周围，取食于地面。

俗名

斑鸠、东方斑鸠、花翼、金背斑鸠、绿斑鸠、麒麟斑、麒麟鸠、山鸽子、雉鸠、棕背斑鸠。



鸽形目 COLUMBIFORMES 鸠鸽科 Columbidae

名称：红嘴蓝鹊 [hóng zuǐ lán què]

学名： *Urocissa erythrorhyncha*



形态特征


体长（68厘米）且具长尾的亮丽蓝鹊。头黑而顶冠白。与黄嘴蓝鹊的区别在嘴猩红，脚红色。腹部及臀白色，尾楔形，外侧尾羽黑色而端白。

分布习性

常见并广泛分布于林缘地带、灌丛甚至村庄。

俗名

长尾巴练、长尾山鹊、赤尾山鸦、山鹊、山鹇。



雀形目 PASSERIFORMES 鸦科 Corvidae

名称：小嘴乌鸦 [xiǎo zuǐ wū yā]

学名： *Corvus corone*



形态特征


体大（50厘米）的黑色鸦。与秃鼻乌鸦的区别在嘴基部被黑色羽，与大嘴乌鸦的区别在额弓较低，嘴虽强劲但形显细。

分布习性

喜结大群栖息，但不像秃鼻乌鸦那样结群营巢。取食于矮草地及农耕地，以无脊椎动物为主要食物，但喜吃尸体，常在道路上吃被车辆压死的动物。一般不像秃鼻乌鸦那样栖于城市。

俗名

细嘴乌鸦。



雀形目 PASSERIFORMES 鸦科 Corvidae

名称：绿背山雀 [lǜ bèi shān què]

学名： *Parus monticolus*



形态特征

体型略大（13厘米）的山雀。似腹部黄色的大山雀亚种，但区别在上背绿色且具两道白色翼纹。

分布习性

似大山雀。冬季成群。



雀形目 PASSERIFORMES 山雀科 Paridae

名称：三趾鸦雀 [sān zhǐ yā què]

学名： *Cholornis paradoxus*




中国特有

形态特征

体型略大（23厘米）的橄榄灰色鸦雀。冠羽蓬松，白色眼圈明显，颏、眼先及宽眉纹深褐色。初级飞羽羽缘近白，拢翼时成浅色斑块。

分布习性

结小群栖于阔叶林及针叶林中的竹林密丛。



雀形目 PASSERIFORMES 鹟莺科 Sylviidae

名称：眼纹噪鹛 [yǎn wén zào méi]

学名： *Garrulax ocellatus*




形态特征

体大（31厘米）的噪鹛。顶冠、颈背及喉黑色，上体及胸侧具粗重点斑。眼先、眼下及颈浅皮黄色而与黑色的头成对比。上体褐，各羽的次端黑而端白形成月牙形点斑。翼羽羽端白色形成明显的翼斑，尾端白色。西藏南部的亚种耳羽栗色。与大噪鹛的区别在尾较短且喉为黑色。

分布习性


不罕见于海拔1100~3100米的多林山区。成对或结小群于腐叶间找食。有时与其他噪鹛混群。



雀形目 PASSERIFORMES 噪鹛科 Leiothruidae

名称：白喉噪鹛 [bái hóu zào méi]

学名： *Garrulax albogularis*




形态特征

中等体型（28厘米）的暗褐色噪鹛。特征为喉及上胸白色。亚种 *laebus* 额有狭窄棕色，*albogularis* 的额棕色宽，*ruficeps* 整个头顶及颈背全棕色。上体余部暗烟褐色，外侧四对尾羽羽端白色，下体具灰褐色胸带，腹部棕色。台湾的亚种尾下覆羽白色。

分布习性

性吵嚷，结小至大群栖于森林树冠层或于浓密的棘丛。



雀形目 PASSERIFORMES 噪鹛科 Leiothrichidae

名称：橙翅噪鹛 [chéng chì zào méi]

学名： *Trochalopteron elliotii*



形态特征

中等体型（26厘米）的噪鹛。全身大致灰褐色，上背及胸羽具深色及偏白色羽缘而成鳞状斑纹。脸色较深。臀及下腹部黄褐。

分布习性

结小群于开阔次生林及灌丛的林下植被及竹丛中取食。



雀形目 PASSERIFORMES 噪鹛科 Leiothrichidae

名称：红翅噪鹛 [hóng chì zào méi]

学名： *Trochalopteron formosus*



形态特征


体型大（28厘米）的噪鹛。两翼及尾绯红。似赤尾噪鹛但区别在头顶灰色而具黑色纵纹，上背、背及胸褐色。

分布习性

惧生，结群栖于茂密常绿林、次生林及竹林的地面或近地面处。

俗名

丽色噪鹛。



雀形目 PASSERIFORMES 噪鹛科 Leiothrichidae

名称：灰翅鸫 [huī chì dōng]

学名： *Turdus boulboul*



形态特征

体型略大（28厘米）的鸫。雄鸟：似乌鸫，但宽阔的灰色翼纹与其余体羽成对比。腹部黑色具灰色鳞状纹，嘴比乌鸫的橘黄色多，眼圈黄色。雌鸟全橄榄褐色，翼上具浅红褐色斑。

分布习性

栖于海拔640~3000米的干燥灌丛或常绿山地森林，冬季下移。



雀形目 PASSERIFORMES 鸫科 Turdidae

名称：宝兴歌鸫 [bǎo xìng gē dōng]

学名： *Turdus mupinensis*



中国特有

形态特征

中等体型（23厘米）的鸫。上体褐色，下体皮黄而具明显的黑点。与欧歌鸫的区别在耳羽后侧具黑色斑块，白色的翼斑醒目。

分布习性

一般栖于林下灌丛。单独或结小群。甚惧生。



雀形目 PASSERIFORMES 鸫科 Turdidae

名称：金色林鸫 [jīn sè lín qú]

学名： *Tarsiger chrysaeus*



中国特有

形态特征

体大（19厘米）的黑色及栗色溪鸫。头顶及颈背白色，腰、尾基部及腹部栗色。雄雌同色。亚成鸟色暗而近褐，头顶具黑色鳞状斑纹。

分布习性


作垂直迁移的候鸟，冬季多藏匿。



雀形目 PASSERIFORMES 鶲科 Muscicapidae

名称：白顶溪鸲 [bái dǐng xī qú]

学名： *Chaimarrornis leucocephalus*



形态特征

体小（14厘米）而优雅的林鸲。雄鸟：头顶及上背橄榄褐色；眉纹黄，宽黑色带由眼先过眼至脸颊；肩、背侧及腰艳丽橘黄，翼橄榄褐色；尾橘黄，中央尾羽及其余尾羽的羽端黑色；下体全橘黄。雌鸟：上体橄榄色，近黄色的眉纹模糊，眼圈皮黄，下体赭黄。

分布习性

特征为常立于水中或于近水的突出岩石上，降落时不停地点头且具黑色羽梢的尾不停抽动。求偶时作奇特的摆晃头部的炫耀。

俗名


白顶溪红尾、白顶水、看水童子、白顶鸲。



雀形目 PASSERIFORMES 鸲科 Muscicapidae

名称：紫啸鸫 [zǐ xiào dōng]

学名： *Corvus corone*



形态特征

体大（32厘米）的近黑色啸鸫。通体蓝黑色，仅翼覆羽具少量的浅色点斑。翼及尾沾紫色闪辉，头及颈部的羽尖具闪光小羽片。诸亚种于细部上有异。

分布习性

栖于临河流、溪流或密林中的多岩石露出处。地面取食，受惊时慌忙逃至覆盖下并发出尖厉的警叫声。

俗名


黑雀儿、鸣鸡、山鸣鸡、乌精、箫声鸫。



雀形目 PASSERIFORMES 鸫科 Muscicapidae

名称：领岩鹀 [lǐng yán liù]

学名： *Prunella collaris*



形态特征

体大（17厘米）的褐色具纵纹的岩鹀。黑色大覆羽羽端的白色形成对比的两道点状翼斑。头及下体中央部位烟褐，两胁浓栗而具纵纹，尾下覆羽黑而羽缘白色，喉白而具由黑点形成的横斑。初级飞羽褐色，与棕色羽缘成对比的翼缘。尾深褐而端白。亚成鸟下体褐灰具黑色纵纹。

分布习性

多栖于较眼纹噪鹛为高的地带。



雀形目 PASSERIFORMES 岩鹀科 Prunellidae

名称：黄颈拟蜡嘴雀

[huáng jǐng nǐ là zuǐ què]

学名： *Mycerobas affinis*




形态特征

体大（22厘米）且头大的黑黄色雀鸟。嘴特大。成年雄鸟头、喉、两翼及尾黑色，其余部位黄色。雌鸟头及喉灰，覆羽、肩及上背暗灰黄。雄性幼鸟似成鸟但色暗。

分布习性

栖于沿林线附近的有矮小栎树及杜鹃和桧树灌丛的针叶林及混交林。冬季结群活动。飞行径直而迅速。



雀形目 PASSERIFORMES 燕雀科 Fringillidae



两栖爬行类

Amphibians



名称：山烙铁头 [shān lào tiě tóu]

学名： *Trimeresurus monticola*




形态特征

有颊窝、头背都是小鳞片；体色棕褐，与原矛头蝮相似，区别在于本种头背左右眶上鳞间一横排有小鳞5~10枚，左右鼻间鳞相切或隔1~3枚鳞片。

分布习性

常栖于灌木林、草丛、茶山或耕地以及有时也见于路边及住宅周围。分布于喜马拉雅山东段包括尼泊尔，不丹，锡金，印度(阿萨姆)，向东经缅甸，泰国到中南半岛各国，向南到马来西亚，及中国大陆和台湾。



有鳞目 SQUAMATA 蝰科 Viperidae



鱼类

Fishes



名称：宽鳍鱮 [kuān qí là]

学名： *Zacco platypus*




形态特征

口略大，上下颌合侧无缺刻。下咽齿3行或2行。侧线鳞41~49枚。生殖季节雄鱼臀鳍第1~4根分枝鳍条延长达尾鳍基部，头部和臀鳍上均出现珠星。体色鲜艳。

分布习性

多生活于江河之支流，喜欢栖息于水流较急的沙石浅滩。通常以甲壳类为主食，兼食小鱼、藻类和有机碎屑。



鲤形目 CYPRINIFORMES 鲤科 Cobitidae

名称：石爬鮡 [shí pá zhào]

学名： *Euchiloglanis* spp.



形态特征


齿尖锥形，密生，齿带同原鮡，唇后沟不连续，间隔较宽。鳃孔中等，下角可伸达胸鳍第一分枝鳍条的基部。胸鳍分枝鳍条12~14。各鳍无硬刺，无胸吸着器。

分布习性

为一种流水性底栖鱼类，活动范围很狭，无洄游现象。常栖息于山涧溪河多砾石的急流滩上，以扁平的腹部和口胸的腹面附贴于石上，用匍匐的方式移动。

俗名

石爬子、青石爬子、黄石爬子、火箭鱼。



鲇形目 SILURIFORMES 鮡科 Sisoridae